

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -1-4-65 086159

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS
C. C. P. : ORLÉANS 4.604.25

ABONNEMENT ANNUEL

15 Francs

Supplément n° 3 au Bulletin Technique n° 54

26 MARS 1965

- 6 -

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER

Les premières projections d'ascospores ont été observées. Elles sont encore très faibles. Mais elles peuvent devenir rapidement plus importantes.

Toutes les variétés de poiriers sont au moins arrivées au stade C3, à partir duquel elles peuvent être contaminées.

Il y a donc lieu d'effectuer un traitement dès réception de ce Bulletin ou au plus tard dans les tous premiers jours de la semaine prochaine dans tous les vergers de poiriers où le traitement conseillé dans notre Bulletin du 18 Mars n'a pas été effectué.

Ce traitement peut être retardé de quelques jours si celui qui a été conseillé dans le dernier Bulletin vient d'être appliqué. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il a souvent été effectué dans de mauvaises conditions et que le développement de la végétation diminue très rapidement son efficacité.

TAVELURE DU POMMIER

Les premiers périthèces sont également mûrs. Il est donc conseillé d'effectuer un premier traitement sur toutes les variétés précoces dont la majorité des boutons floraux a atteint ou dépassé le stade C3.

Nous rappelons que pour les variétés plus tardives ce traitement devra être appliqué au fur et à mesure que la majorité de leurs boutons floraux arrivera au stade C3, sans attendre un nouvel avis de la Station.

INFORMATIONS

ARBRES FRUITIERS

OIDIUM DU POMMIER

Il est conseillé d'effectuer un premier traitement sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C. Nous rappelons que l'efficacité de la lutte contre l'Oïdium dépend de la mouillabilité de la bouillie et de l'abondance de la pulvérisation.

768

.../...

CLOQUE DU PECHER

Le traitement effectué selon les conseils donnés dans nos précédents Bulletins a perdu la plus grande partie de son efficacité par suite des pluies abondantes et fréquentes.

Il y a donc lieu de le renouveler en utilisant un des Fongicides organiques de synthèse mentionnés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

MONILIA DE L' ABRICOTIER

Les abricotiers arrivent au stade de pré-floraison où ils deviennent très sensibles aux attaques du Monilia.

Il est donc conseillé d'effectuer un traitement en utilisant un produit à base de Cuivre ou un Fongicide organique de synthèse tels que le CAPTANE, le DICHLONE ou le THIRAME.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles,
G. RIBAUT.
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
G. BENAS.